

INFORMACJA DLA PACJENTA ORAZ FORMULARZ ŚWIADOMOŚCI ZGODY NA PRZEPROWADZENIE ZABIEGU LHP(Laserowa Plastyka Hemoroidów)

.....

Wyrażam zgodę na wykonanie przez dr..... i jego współpracowników zabiegu:

.....

1) OPIS CHOROBY:

Przyczyną kwalifikacji do operacji, którą proponujemy Pani/Panu jest:

.....
.....
.....

Rozpoznano u Pana/Pani chorobę hemoroidalną (guzki krwawnicze, hemoroidy). Hemoroidy są to poszerzone sploty żyłne okolicy odbytu, przyjmujące najczęściej postać guzków. Bezpośrednią przyczyną powstawania hemoroidów jest utrudniony odpływ krwi żyłnej ze splotu odbytniczego, prowadzący do jego poszerzenia. Przyczyną powstania guzków krwawniczych odbytu są głównie przewlekłe zaparcia, siedzący tryb życia, ciąża. Najczęstsze objawy tej choroby to: krwawienie świeżą, jasnoczerwoną krwią, pojawiającą się na powierzchni stolca. W okolicach odbytu mogą pojawić się łatwo wyczuwalne, czasem bolesne guzki.

2) METODA LECZENIA

- Laserowa Plastyka Hemoroidów (LHP)

3) OPIS ZABIEGU LHP(Laserowej Plastyki Hemoroidów)

Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu dożylnym oraz/lub w znieczuleniu miejscowym nasiękowym. Dokładnych informacji na temat znieczulenia i możliwych jego powikłań udzieli lekarz operator i lekarz anestezjolog. Zastosowane leczenie przeprowadzone jest przy pomocy lasera BIOLITEC LEONARDO. Zabieg polega na wprowadzeniu światłowodu do guzka krwawniczego i podaniu energii światła o długości 1470nm. Prowadzi to do zniszczenia, obkurczenia i zmniejszenia objętości hemoroidu.

Zabieg Laserowej Plastyki Hemoroidów przeprowadzony jest w sterylnych warunkach przy zastosowaniu jednorazowego sprzętu.

Przygotowanie pacjenta do zabiegu:

Do ośrodka pacjent przyjmowany jest w godzinach wcześniej ustalonych na wizycie konsultacyjnej, wskazana jest obecność osoby towarzyszącej. Pacjent wymaga konkretnego przygotowania do zabiegu, które jest szczegółowo omawiane na pierwszorazowej wizycie. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza operatora o chorobach współistniejących, jak i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające leczenie. Pacjent powinien zapewnić sobie opiekę osoby trzeciej w dobie pooperacyjnej.

Pacjent opuszcza nasz Ośrodek po około 2 godzinach od zakończeniu zabiegu.

Lekarz wyjaśnił mi korzyści wynikające z zastosowania zabiegu.

4) MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWIKŁAŃ

Różne, trudne do przewidzenia trudności techniczne występujące podczas zabiegu operacyjnego mogą spowodować, że pomimo starań podczas operacji, jak i po jej zakończeniu może dojść do wystąpienia powikłań takich jak:

- ból pooperacyjny
- krwawienie śródoperacyjne i pooperacyjne, niekiedy wymagające przetoczenia krwi lub ponownej operacji
- przedłużenia krwawienia, po 7-16 dniach od zabiegu
- tworzenie się zakrzepów w układzie żylnym, co zagraża: zakrzepicą naczyń kończyn dolnych, naczyń jamy brzusznej, a w przypadku oderwania zakrzepu zatorem tętnicy płucnej, lub mikrozatorowością płuc
- powstaniem zatorów tętnic, które mogą spowodować między innymi zawał serca, udar mózgu, lub zamknięcia innych tętnic obwodowych
- powikłania ze strony układu krążenia- nasilenie niewydolności krążenia, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego
- niekiedy mogą wystąpić uszkodzenia lub oparzenia skóry przez środki dezynfekcyjne, prąd elektryczny czy światło lasera stosowane podczas zabiegu
- alergię na leki stosowane w okresie okołoperacyjnym – szczególnie leki stosowane podczas znieczulenia, antybiotyki oraz środki przeciwbólowe.
- zakażenie rany
- obrzęk okolicy odbytu
- zakrzepica przyodbytowego splotu żylnego
- zakażenie układu moczowego
- uciążliwe krótkotrwałe zaparcia
- trudności z oddawaniem moczu
- powikłania związane z zakładaniem i obecnością wkłuc dożylnych(miejscowa infekcja, krwiak, obrzęk, zakażenia wkłucia)
- nietrzymanie stolca
- przetoka odbytowa
- zwężenie odbytu
- zaburzenia oddawania stolca gazów
- szczelina odbytu
- nawrót hemoroidów
- nietrzymanie stolca

Powikłania także mogą wynikać z reakcji na lek użyty do znieczulenia- lignokaina. Objawy niepożądane działania lignokainy to najczęściej parestezja i drętwienia wokół ust oraz w obrębie rąk, zwolnienia mowy, niepokój, euforia, senność, uczucie lęku, zaburzenia pamięci, rzadziej występują nudności, wymioty, drżenia mięśniowe, zaburzenia świadomości, w przypadku przedawkowania bradykardia, dekompensacja krążenia, omdlenie a w skrajnie ciężkich przypadkach zatrzymanie czynności serca. Reakcje alergiczne po zastosowaniu lidokainy występują niezwykle rzadko i zwykle mają charakter zmian skórnych, pokrzywki, obrzęków, objawów anafilaktycznych. Aby zapobiec wystąpieniu opisanych objawów stosujemy stężenie 0,1% lidokainy i podajemy minimalną wymaganą ilość leku.

Zostałem poinformowany o możliwości wystąpienia powikłań

