



**INFORMACJA DLA PACJENTA - PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII DLA OSÓB  
PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ PREPARATEM MOVIPREP**

**3 DNI PRZED BADANIEM PROSIMY ZADZWONIĆ I POTWIERDZIĆ OBECNOŚĆ NA BADANIU**

**TEL 507-096-308 , 32/228-09-44**

**PRZYGOTOWANIE DO BADANIA - Należy bezwzględnie przestrzegać!**

Przygotowanie do badania jest bardzo ważne, ponieważ od tego zależy czy i jak dokładnie zostanie przeprowadzone badanie i czy nie będzie trzeba go powtórzyć. Dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą ulotką i zastosowanie się do wskazówek.

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu polegającym na oczyszczeniu jelita za pomocą diety i doustnie podawanych środków przeczyszczających. Normalną reakcją w czasie przygotowywania się do badania będą liczne wypróżnienia, pod koniec samą treścią płynną i wodą. 7 dni przed badaniem nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców, warzyw z pestką i skórką, owoców pestkowych np. winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz maku i pieczywa z ziarnami, jogurtów z ziarnami lub owocami, siemienia lnianego. 2-3 dni przed badaniem dieta lekkostrawna.

**Na 1 dzień przed badaniem:**

**OD RANA NIC NIE JEŚĆ! DUŻO PIĆ!**

Należy zastosować lek przeczyszczający Moviprep. Sposób przygotowania zależy od godziny badania. W dniu badania koniecznie prosimy pozostać na czczo.

**Przygotowanie do badania dla osób mających badanie w godzinach  
popołudniowych - od 14.00**

Rozpuścić OBYDWIE saszetki A i B w 1 litrze niegazowanej wody (może to zająć ok 5 minut: roztwór Moviprep powinien być odrobinę mętny) Po wypiciu 1 litra roztworu (w ciągu godziny) należy następnie wypić jeszcze (w czasie 1-2 godzin) co najmniej 1 litr wody.

W dniu badania rano należy przygotować kolejny litr roztworu Moviprep w analogiczny sposób jak dnia poprzedniego. Przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1 godziny (1 szklanka co 10-15 min). Następnie należy jeszcze wypić co najmniej 1 litr wody.

<b>GODZINA BADANIA</b>	<b>I DAWKA</b>	<b>WYPIJ WODĘ W 2 GODZINY</b>	<b>2 DAWKA</b>	<b>WYPIJ WODĘ W 2 GODZINY</b>
14:00	20:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	08:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
15:00	21:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	09:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
16:00	21:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	10:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
17:00	22:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	11:00	plus obowiązkowo 1 litr wody
18:00	22:00	plus obowiązkowo 1 litr wody	12:00	plus obowiązkowo 1 litr wody



Po wypiciu płynów ze środkami przeczyszczającymi nie wolno przyjmować już żadnych pokarmów stałych ani płynów.

Przygotowanie do badania jest niezwykle ważne, gdyż od tego zależy wartość i bezpieczeństwo badania.

Prosimy poinformować swojego lekarza rodzinnego o przyjmowanych lekach i skonsultować z nim czy w dniu badania można przyjąć leki.

#### **UWAGA!**

Osoby, które przyjmują na stałe leki przeciwkrzepliwe: Acard, Acenocumarol, Polocard, Aspiryna lub inne leki przeciwkrzepliwe powinny się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego lub kierującego na kolonoskopię (co najmniej na tydzień przed badaniem) w celu odstawienia leku lub ewentualnej zamiany na heparyny drobnocząsteczkowe.

#### **Po badaniu:**

Środki znieczulające spowalniają reakcje, dlatego, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, w ciągu 12 godzin po badaniu nie wolno prowadzić samochodu. Nie należy też w tym czasie obsługiwać maszyn i urządzeń mechanicznych. Nie powinno się też spożywać alkoholu.

W przypadku wystąpienia złego samopoczucia (np. zawroty głowy, mdłości), gorączki, bólów brzucha, krwawienia z odbytu, należy natychmiast powiadomić lekarza, nawet jeśli te dolegliwości pojawią się dopiero w kilka dni po badaniu!

#### **UWAGA!**

W dniu badania prosimy zgłosić się z osobą towarzyszącą, zabrać kartkę z wypisanymi lekami aktualnie zażywanyymi oraz okulary (jeśli Państwo korzystacie z okularów do czytania).